



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA Cedex  
Tél. 61.24.06.51

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
Abonnement annuel 115 F.  
Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne  
CCP 8612-11 R Toulouse

I.S.S.N. : 0752-2053

BULLETIN N° 13 DU 16 OCTOBRE 1986

## COLZA

### Stades végétatifs

- Stade cotylédonnaire pour les semis tardifs et dans les situations sèches.
- 4 à 6 feuilles pour les semis à date normale et en situations les mieux arrosées (Gers et ouest du Tarn-et-Garonne notamment).

### GROSSE ALTISE

#### Situation

Captures d'adultes en cuvette jaune régulièrement observées dans la quasi-totalité des cultures depuis une semaine.

#### Préconisations

- Dans les parcelles ayant reçu une protection insecticide au semis, toute intervention insecticide est actuellement inutile.

- En l'absence de protection au semis, deux cas à considérer :

- Cultures n'ayant pas encore atteint le stade 2 feuilles vraies :  
Intervenir lorsque 1 pied sur 3 présente des morsures nutritionnelles.
- Cultures ayant dépassé le stade 2 feuilles :  
Intervenir, afin de limiter les dépôts de pontes, dès le total de 30 captures cumulées en cuvette jaune.

Utiliser l'un des produits efficaces sur Grosse Altise (rubrique "Levée à fin du repos hivernal") de la fiche "Ravageurs du Colza" adressée lors de notre précédent bulletin du 12 septembre 1986.

### DESHERBAGE DE POST-LEVÉE

#### Situation

De nombreuses levées d'adventices, notamment des repousses de céréales, sont actuellement constatées dans les cultures de colzas.

#### Préconisation

Après observation du stade de la culture et des adventices présentes, il sera utile d'envisager ce désherbage dans un grand nombre de situations.  
Choisir un produit indiqué dans le tableau ci-après.

## CEREALES

### RESIDUS D'HERBICIDES APRES MAIS ET TOURNESOL

La dégradation des désherbants de type simazine, atrazine, linuron, trifluraline utilisés sur les cultures d'été (maïs, tournesol), risque d'être insuffisante en raison de la sécheresse de l'été 1986.

Pour éviter d'éventuels risques de phytotoxicité, des précautions doivent être prises dans ces situations :

- Installer si possible les céréales dans des parcelles labourées.
- Choisir avec prudence l'herbicide de pré-levée ; éviter en particulier l'utilisation de produits à base de chlortoluron, méthabenzthiazuron, isoproturon et néburon.
- Pour les blés durs, éviter un semis trop précoce.

P.45

TABLEAU DES HERBICIDES UTILISABLES EN POST-LEVÉE DU COLZA

MATIÈRES ACTIVES	SPECIALITÉS COMMERCIALES	Dose de spéciali- té à l'ha	ÉPOQUE D'APPLICATION	OBSERVATIONS	ACTION SUR	
					GRAMINÉES	DICOTYLÉDONES
Alloxydime- sodium	FERVIN	1 kg  (0,75 kg avec huile)	Utilisable à tout stade du colza, de la levée au stade montaison des graminées.	L'adjonction d'huile (à 3 l/ha) est conseillée contre graminées viva- ces. Appliquer sur vé- gétation active.	bonne sauf sur pâturin	
Carbétamide	LEGURAME PM	3 kg	Dès le stade 4 feuilles du colza, jusqu'à 3 se- maines avant reprise de végétation.	Utilisable même sur sol gelé.	bonne	insuffisant
		4/5 kg	De novembre à fin jan- vier.	Contre chiendent.		
Carbétamide + diméfurone	PRADONE TS	4 kg	Dès le stade 4 feuilles du colza.	Utilisable même sur sol gelé.	bonne	céaistes coquelicots mourons véroniques
3,6 D.C.P.	LONTREL SF 100	1 l	Quel que soit le stade du colza.	Utiliser sur mauvaises herbes développées par t° supérieures à 10°.		anthémis matricaires
Fluazifopbutyl	FUSILADE X 2	0,7 l	Dès le stade cotylédon- naire du colza, quel que soit son stade.	Utiliser très précocé- ment, dès la levée des adventices. L'adjonction d'un mouillant (AGRAL à 0,1 % en volume) est conseillée.	bonne sauf sur pâturin	
Halloxyfop éthoxyéthyl	GALLANT	1 l à 2 l	A l'automne uniquement, quel que soit le stade du colza.	1 l sur graminées an- nuelles. 2 l sur graminées vi- vaces.	bonne	
Propyzamide	KERB 50 W	1 kg	Dès le stade 3 feuilles du colza, jusqu'à la reprise de végétation.	Utilisable sur sol gelé La dose peut être aug- mentée sur graminées vivaces (3 kg sur chiendent agropyrum).	bonne	insuffisant
Propyzamide + diuron	KERB-ULTRA	1,2 kg	Dès le stade 4 feuilles du colza.	Utiliser sur colzas bien implantés, de pré- férence avant l'hiver.	bonne	sanves ravelles
Quizalofop éthyl	TARGA	1,25 l  (1 l avec huile)	Quel que soit le stade du colza.	L'adjonction d'huile (2 l/ha) est conseillée contre graminées viva- ces.	bonne	manque de pré- cision
Sethoxydime	FERVINAL	2,5 l  (1,5 l avec huile)	Quel que soit le stade du colza.	L'adjonction d'huile SCHERING (3 l/ha) est conseillée contre gra- minées vivaces.	bonne sauf sur pâturin	